

**Инструкция по применению
ветеринарного лекарственного препарата «Марбобел OR 0,4»**

1. Торговое наименование.

Марбобел OR 0,4.

2. Международное непатентованное наименование.

Марбофлоксацин (marbofloxacin).

3. Регистрационный номер.

----- 9324-10-26 ВУ-БА

4. Лекарственная форма.

Раствор для приема внутрь.

Описание. Вязкая жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета с зеленоватым оттенком.

5. Состав.

1 мл препарата содержит действующее вещество: марбофлоксацин 4 мг; вспомогательные вещества: аскорбиновая кислота, сорбат калия, гидроксипропилцеллюлоза, ароматизатор, вода очищенная.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Производные нафтиридина, хинолоны, фторхинолоны.

7. Фармакодинамика и механизм действия.

Марбофлоксацин обладает широким спектром антибактериального действия. Активен в отношении грамположительных (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*) и грамотрицательных микроорганизмов (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Morganella morganii*, *Serratia marcescens*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Proteus spp.*, *Yersinia spp.*, *Enterobacter spp.*, *Campylobacter spp.*, *Citrobacter freundii*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Moraxella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*), а также *Mycoplasma spp.*

Механизм действия марбофлоксацина основан на угнетении ДНК-гиразы и топоизомеразы IV, что приводит к нарушению синтеза белка микробной клеткой и ее гибели.

Фармакокинетика. После перорального введения марбофлоксацин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани. Биодоступность близка к 100%. Марбофлоксацин слабо связывается с белками плазмы крови (7% у кошек), значительно распределяется во многие ткани (печень, почки, кожу, легкие, стенку матки) и достигает в них более высоких концентраций, чем в плазме. Максимальная концентрация в крови устанавливается через 2 часа. Период полувыведения составляет у кошек 10 часов.

У кошек примерно 60% пероральной дозы выводится с мочой в неизменном виде.

8. Показания для применения.

Препарат применяют для лечения кошек при инфекционных патологиях органов дыхания, мочеполовой системы, инфицированных ранах, болезнях кожи и мягких тканей, и других болезнях, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к марбофлоксацину.

9. Противопоказания.

Запрещается применять препарат беременным и лактирующим животным; кошкам до

4-месячного возраста; кошкам имеющим в анамнезе заболевания сетчатки; при поражениях центральной нервной системы (ЦНС) сопровождающихся судорогами, существенных нарушениях развития хрящевой ткани; животным с гиперчувствительностью к фторхинолонам; в случае резистентности возбудителя к другим фторхинолонам.

10. Способ применения и дозы.

Препарат применяют один раз в сутки с кормом или принудительно на корень языка в дозе 0,5 мл/кг массы тела животного (2 мг марбофлоксацина/кг массы тела животного).

Курс лечения составляет 3-10 суток.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными средствами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует соблюдать осторожность и избегать прямого контакта препарата с кожей и слизистыми оболочками.

12. Передозировка.

Может наблюдаться нарушение деятельности нервной системы. В этом случае необходимо провести симптоматическую терапию.

13. Беременность и период лактации.

Запрещается применять беременным и лактирующим животным.

14. Особые указания.

Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

15. Побочное действие.

У чувствительных к компонентам лекарственного препарата животных возможны аллергические реакции. В этом случае лечение следует прекратить и назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

При совместном применении с нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) следует соблюдать осторожность у животных, имеющих в анамнезе эпилепсию.

Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклинов, амфениколов.

Прием совместно с железосодержащими и антацидными средствами, содержащими магний, кальций и алюминий, а также молочными кормами приводит к снижению всасывания марбофлоксацина, поэтому его следует назначать за 1-2 ч до или через 4 ч после приема вышеуказанных средств и кормов.

17. Форма выпуска.

Полимерные флаконы по 10 и 20 мл. Флаконы упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

18. Срок годности.

Срок годности 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат транспортируют и хранят в защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

20. Условия отпуска.

Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин».

Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16, тел. +375 (212) 617-666, inf@belkarolin.com.

23. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин».

Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16, тел. +375 (212) 617-666, inf@belkarolin.com.

24. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин».

Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 210101, г. Витебск, ул. Экономическая, 16, тел. +375 (212) 617-666, inf@belkarolin.com.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 35 от 04.06.2026